

문서번호 대의협 제0643 - 14906호

시행일자 2023. 3. 6.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 그룹 A형 로타바이러스 감염증 국가예방접종 실시에 따른 이상반응 관련 안내
(질병관리청)

1. 귀회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 질병관리청 예방접종관리과-870(2023.3.3.)

3. 그룹 A형 로타바이러스 감염증의 국가예방접종 지원사업 시행에 따라, 질병관리청에서는 그룹 A형 로타바이러스 감염증 예방접종 안전성 정보 및 이상반응 신고에 대하여 다음과 같이 우리협회로 안내해온 바, 귀회 소속회원들에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

가. 그룹 A형 로타바이러스 예방접종 안전성 정보

- 1) 전 세계 114개국, OECD 38개국 중 24개국에서 광범위하게 접종하고 있으며, 일반적으로 설사, 구토, 복통 등의 위장관계 이상사례가 나타날 수 있고, 대부분이 경미한 이상사례입니다.
 - 국내에서 6년 동안 실제 접종한 대상자를 대상으로 시판 후 조사를 실시한 결과, 발열, 구토, 보챔, 설사 등이 각 1~3% 정도로 보고되었습니다.
- 2) 매우 드물게 아나필락시스, 장중첩증 등이 발생한다고 알려져 있습니다.

나. 그룹 A형 로타바이러스 예방접종 이상사례 신고범위 지정

- 1) 예방접종 안전성 관리 강화를 위하여, 그룹 A형 로타바이러스 감염증 예방접종 후 신고하여야 하는 이상반응 범위 및 시간을 명시하는 고시를 개정하였습니다.
- 2) 이를 참고하시어, 원활한 이상반응 감시 및 신고가 이루어질 수 있도록 협조를 부탁드립니다.

「필수예방접종이 필요한 감염병 지정 등」 별표(질병관리청 고시 제2023-4호)		
예방접종	이상반응의 범위	예방접종 후 이상반응이 나타날 때까지의 시간
그룹 A형 로타바이러스 감염증	1. 아나필락시스	24시간 이내
	2. 장충접증	21일 이내
	3. 그 밖에 접종과 연관성이 있는 것으로 의심되는 이상반응	기한 없음
	4. 제1호부터 제3호로 인한 후유증	기한 없음

※ 발령일 : 2023년 3월 6일

다. 예방접종 후 심각한 이상사례(아나필락시스 등)가 발생할 경우, 의료진이 신속하게 대응을 할 수 있도록 접종자는 예방접종 후 접종기관에서 20~30분간 머무르며 이상 반응 발생을 관찰하고 있습니다. 이를 준수하여 안전한 예방접종이 될 수 있도록 협조를 부탁드립니다.

※ 붙임 :

1. 질병관리청 공문 1부.
2. 2023년 로타바이러스 국가예방접종 지원사업 관리지침 1부.
3. 「필수예방접종이 필요한 감염병 지정 등」(질병관리청고시) 개정 전문 1부. 끝.

대한의사협회장

“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”



수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공중보건 의사협의회장, 한국여자의사회장