

트라마돌 함유 제제 안전사용 정보지

식품의약품안전처에서는 트라마돌 함유 제제를 복용하시는 환자분께 해당 약제의 복용 전 주의사항에 대해 알려드리고자 본 정보지를 마련하였습니다.

트라마돌 제제의 효능·효과

: 트라마돌 제제는 중증 및 중등도의 급만성 통증 등에 사용되는 약물입니다.

트라마돌 제제 복용 시 주의사항

- 1 반드시 의사의 처방전에 표시된 복용법(1회 복용량, 1일 복용 횟수, 복용 기간)에 따라 복용합니다.
: 1일 최대 권장용량 초과 시 경련 위험성 등이 증가할 수 있습니다.
: 장기간 복용 시 내약성으로 인한 정신적·육체적 의존성이 발생할 수 있습니다.
- 2 약물남용 또는 의존성이 있는 환자의 경우 정신적·육체적 의존성 발생 가능성이 증가할 수 있어 이 약을 처방받기 전에 의사와 상의하시기 바랍니다.

트라마돌 제제에 대한 기타 주의사항

- 1 트라마돌 제제를 12세 미만 소아 또는 편도절제술 및/또는 아데노이드절제술을 받은 18세 미만 소아에게 사용하여서는 안 됩니다.
: 생명에 치명적인 호흡억제를 일으킬 수 있습니다.
- 2 기타 이 약으로 인한 중추신경계 이상반응은 다음과 같습니다.
: 졸음, 수면, 두통, 두중감, 흥분, 진전, 이명, 양손의 저린감, 불안감, 허탈, 피로, 권태감, 발한, 어지러움, 휘청거림, 불쾌감, 배뇨곤란, 구내건조, 구갈, 착란, 협조장애, 다행증, 초조, 수면장애, 인식장애, 환각, 건망증, 집중장애, 우울 등
- 3 이 약은 태아 또는 수유 유아에게 노출된 경우 금단증상 등을 야기할 수 있으므로 임부 또는 수유부는 복용하지 않습니다.
- 4 어린이 또는 타인의 손이 닿지 않는 곳에 안전하게 보관합니다.

귀하가 트라마돌 제제를 복용하는 중 의존성 또는 오남용 등 이상사례를 경험하게 되거나 알게 된 경우에는 즉시 병 의원을 방문하여 의사와 상담하시고 의약품 공급자(제조업자 수입업자) 또는 한국의약품안전관리원 1644-6233에 알려 주시기 바랍니다.