

경구용 코로나19 치료제

'팍스로비드' 복용설명서



QR코드를 찍으면 자세한
[환자 및 보호자용 설명서]
를 확인할 수 있습니다.

제품명	팍스로비드정	
성분 / 함량	니르마트렐비르 150mg (1정당)	리토나비르 100mg
성상	니르마트렐비르 2정과 리토나비르 1정이 함께 포장된 제품 ● 니르마트렐비르 분홍색의 타원형 필름코팅정제 2개 ● 리토나비르 흰색에서 거의 흰색의 장방형 필름코팅정제 1개	
용법 / 용량	● 니르마트렐비르 2정과 리토나비르 1정을 함께 1일 2회 5일간 총 10회 복용 ● 코로나19 양성 진단을 받고 가능한 빨리, 그리고 베이스라인에서 코로나19 증상이 경증이라도 증상 발현 후 5일 이내 에 투여 시작되어야 합니다. ● 통째로 삼켜야 하며 씹거나, 깨트리거나, 부수지 않아야 합니다. * 중등도 신장에 환자의 경우 니르마트렐비르 1정 + 리토나비르 1정으로 감량 할 수 있습니다.	
효능 / 효과	입원이나 사망을 포함한 중증 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 진행될 위험이 높은 성인에서 경증 및 중등증 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 환자의 치료 <small>*팍스로비드는 중증 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 진행될 위험이 높은 성인 및 소아(12세 이상이고 체중 40kg 이상)에서 경증 및 중등증 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 치료를 위해 한국 식품의약품안전처에서 긴급사용승인한 품목으로서, 한국에서 성인에 대해서만 의약품 품목 허가가 되었습니다.</small>	
저장방법	기밀용기, 실온보관(15°C-30°C)	

'팍스로비드' 어떻게 복용하나요?

한 번에 정제 3개를  +  1일 2회 복용



니르마트렐비르

리토나비르

*실제 정제 사이즈와 다를 수 있습니다.

1. 블리스터 5개 포장단위 제품 (국문 또는 일본어 표시 제품)

2. 블리스터 10개 포장단위 제품 (영문 표시제품)



- 공급되는 제품은 외국어(영문 등) 표시제품이 공급될 수 있으며, 제품에 따라 포장단위가 다를 수 있습니다.
- 포장재는 외국어로 기재되어 있으나[용법·용량] 동일한 제품입니다.

5일간 총 10회분 복용

- 식사와 관계없이 복용 가능합니다.
- 5일간 총 10회분을 **복용 중단 없이 치료과정을 완료**하는 것이 중요합니다.
- 12시간 간격으로 복용해야 하므로 첫 회차 복용 시간을 생활 습관상 잊지 않고 복용하기 편한 시간으로 정해주세요.
예) 오전 9시 / 오후 9시

'약 복용을 잊은 경우' 유의사항

조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 연락하시고 아래와 같이 복용하세요.

① 복용 해야 할 시간으로부터 8시간 이내인 경우

- 인지한 시점에 바로 복용하고 다음 회차는 원래 정해진 시간에 복용
- 이후 복용 시간 원래대로 유지

② 복용 해야 할 시간으로부터 8시간 초과인 경우

- 인지한 시점에는 약을 먹지 않고 예정된 다음 회차에 복용
- 이후 복용 시간 원래대로 유지

※ 한꺼번에 두 배의 용량을 복용하지 마세요

기타 팍스로비드 복용방법 등에 대한 문의는 조제약국 혹은 제조사인
한국화이자제약 콜센터 1533-1900로 연락하시기 바랍니다.

팍스로비드를 복용하기 전에 약사에게 알려야 할 사항은 무엇인가요?

약사에게 아래 사항에 해당되는 경우에 알려주세요

- 약물 알레르기가 있는 경우
- 간질환 또는 신장질환이 있는 경우
- 수유 중인 경우
- 중대한 질환이 있는 경우
- 임신했거나 임신 예정인 경우

전문의약품 및 일반의약품, 비타민 등 영양제, 생약 보조제를 포함하여 **현재 복용 중인 모든 의약품**을 조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알려주세요.

약 복용 중간에 추가로 새로운 의약품을 복용하게 될 경우 조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알린 후 새로운 약을 복용하세요.

이 약 복용 후에 나타나는 이상사례는 조제약사 혹은 의사(관리의료기관)에게 알려주세요. 아래의 방법에 따라 **한국의약품안전관리원**으로 부작용을 보고하시거나 상담전화 (**☎1644-6223**)로 문의하실 수 있습니다.

부작용 상담·신고채널
한국의약품안전관리원 | 온라인 보고(신고) : kaers.drugsafe.or.kr
전화상담 : 1644-6223



식욕부진
미각변화



질은 색 소변
창백한 색 변



설사



근육통



고혈압

** 이러한 증상 이외에도 다른 부작용이 있을 수 있습니다.

의약품 부작용에 대한 피해구제에 대해 상담을 받거나 신청하고자 하는 경우 **한국의약품안전관리원** (<http://www.karp.drugsafe.or.kr>, ☎ 1644-6223)으로 연락하시기 바랍니다.

'팍스로비드'를 복용한 후 부작용으로 인해 입원 치료 등 중대한 피해가 발생한 환자 등은 '의약품부작용피해구제'를 신청할 수 있으며, 부작용 간의 인과성이 인정되는 경우 피해보상이 가능합니다.

팍스로비드를 복용중단하게 되면 남은약은 어떻게 하나요?

- 이 약 복용 후 이상 반응 등 증상 발생에 따른 투약중지 시, 잔여 치료제는 반납·폐기가 원칙입니다.
- 의사의 진단·처방없이 타인에게 투약하는 것은 매우 위험하며, 관련 법상 처벌될 수 있습니다.
- 남은 약 폐기 방법



① 소독제 등으로 소독 후
지퍼백 등에 밀봉하여 보관




② 격리해제 후 일주일 이내



③ 인근 약국 또는 보건소
수거함에 폐기

* 기타 지자체별 폐의약품 수거방식 활용 가능



기타 팍스로비드 복용방법 등에 대한 문의는 조제약국 혹은 제조사인
한국화이자제약 콜센터 1533-1900로 연락하시기 바랍니다.